


Ueber
einige Derivate des Coffeins.

Inaugural - Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
der
hohen philosophischen Facultät
der
Kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt von
Eduard Baumeister
aus München.

München
Druck von Val. Höfling, Kapellenstrasse Nr. 3
1898.

Ueber
einige Derivate des Coffeïns.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
der
hohen philosophischen Facultät
der
Kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt von
Eduard Baumeister
aus München.



München
Druck von Val. Höfling, Kapellenstrasse Nr. 3
1898.

Meinen Eltern
in Liebe und Dankbarkeit
gewidmet.

Vorliegende Arbeit wurde im chemischen Laboratorium der Akademie der Wissenschaften zu München ausgeführt.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, Herrn Professor Dr. A. Einhorn, auf dessen Anregung und unter dessen lebenswürdiger Leitung diese Arbeit entstand, sowie Herrn Geheimrath Professor Dr. A. v. Baeyer für das freundliche Interesse, welches mir derselbe entgegenbrachte, meinen wärmsten Dank auszusprechen.




Digitized by the Internet Archive
in 2026

Einleitung.

Das Coffeïn zog schon vor mehr denn 60 Jahren die Aufmerksamkeit hervorragender Chemiker auf sich, doch seit Feststellung der empirischen Formel des Alkaloids durch Pfaff, Liebig, Wöhler kam man über die ersten Versuche zur Feststellung seiner Constitution nicht hinaus. Stenhouse fand als Oxydationsprodukt

des Coffeïns das Cholesterophan $\text{CO} \begin{matrix} \swarrow \text{NCH}_3\text{CO} \\ \searrow \text{NCH}_3\text{CO} \end{matrix}$, Rochleder entdeckte

das Chlorcoffeïn. Weiter drang Strecker¹⁾ in der Kenntniss der Base vor. Fussend auf der damals weit verbreiteten Ansicht, dass auch Coffeïn gleich mehreren andern Körpern, wie Theobromin, Xanthin, Guanin, als zusammengehörig mit der seinerzeit sehr umworbenen Harnsäure zu betrachten seien, zeigten doch alle diese Körper sowohl in ihren chemischen Formeln als auch in ihren Zersetzungsprodukten viel Aehnlichkeiten unter einander, suchte er 1861 experimentell Beziehungen zwischen Coffeïn und dem der Harnsäure sehr nahe stehenden Xanthin aufzufinden, doch misslang ein Versuch, Xanthinsilber mittelst Jodmethyl in Theobromin überzuführen. Dagegen vermochte er auf ähnliche Weise Coffeïn aus Theobrominsilber herzustellen, erkannte mithin Coffeïn als Methylderivat des Theobromins. Weitere Versuche, der Constitution des Coffeïns durch Zerlegen desselben mittelst Barythydrat näherzukommen, führten ihn auf das Coffeïdin $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}$, für dessen Bildung aus Coffeïn er die Gleichung aufstellte:




Einige Zeit später brachten noch weitere von ihm im Verein mit Rosengarten²⁾ in dieser Richtung unternommene Versuche


1) Ann. 123, 360.

2) Ann. 157, 1 (1871).


die Bestätigung der 1867 von Schulzen¹⁾ aufgestellten Zersetzungsgleichung für Coffeïn durch Alkali:



1883 zeigte Schmidt²⁾, dass diese Gleichung auch für die Zersetzung des Coffeïns durch Mineralsäuren giltig sei. Eine den Umsetzungen des Coffeïns entsprechende Formel aufzustellen, war Strecker nicht mehr vergönnt. Mit um so grösserem Glücke unterzog sich Ludwig Medicus³⁾ dieser in Anbetracht der damals noch ziemlich mangelhaften Kenntnisse über Coffeïn schwierigen Aufgabe. Auf Grund der obigen Gleichungen entsprechenden Zersetzungsvorgänge und gestützt auf die damals verbreitete Meinung, dass auch Coffeïn und Xanthin gleich der Harnsäure, deren Constitution er auf Grund ihrer oxydativen Zersetzung in Alloxan $\text{CO} \begin{smallmatrix} \text{NH} \cdot \text{CO} \\ \text{NH} \cdot \text{CO} \end{smallmatrix} \text{C}(\text{OH})_2$ und Harnstoff $\text{CO} \begin{smallmatrix} \text{NH}_2 \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix}$ ableitete, als gleichzeitige Produkte der regressiven Stoffmetamorphose ähnlich constituirt sein müssten, stellte er die heute von Emil Fischer wohl begründete Formel für Coffeïn auf:



ohne aber damit allseitig durchzudringen, denn Formeln für Harnsäure, aus denen man eine Coffeïnformel ableiten konnte, waren damals mehrere bekannt, insbesondere erfreute sich die Harnsäureformel Fittigs:



grösserer Beachtung, welche Formel erst 10 Jahre später Emil Fischer durch seine Untersuchungen über die Zersetzungsprodukte methylirter Harnsäuren⁵⁾ zweifelhaft machte. Auch dieser stellte im Jahre 1882 eine rationelle Formel für Coffeïn auf:


1) Zeitschr. f. Ch. 1867, 614.

2) Ann. 217, p. 270.



3) Ann. 175, 243 (4. Sept. 1874).

4) Fittig's Grundr. f. org. Chemie, 1877.


5) Ber. 1884, 2 p. 1776, 1785.



welche sich von der Medicus'schen Formel durch die Lage der Doppelbindungen und der Carbonylgruppe unterscheidet, und zwar auf Grund seiner Entdeckung, dass sich auch Coffein, gleich der Harnsäure, durch Oxydation mit Kaliumchlorat und Salzsäure in zwei Hauptprodukte, Dimethylalloxan und Monomethylharnstoff zerlegen lässt, nach der Gleichung:



welches Resultat durch die ungefähr gleichzeitig erschienenen Arbeiten von Maly und Hinteregger²⁾: „Ueber Oxydation von Coffein“ bestätigt wurde. Vermochte Fischer auf Grund dieser und der bereits von Schulzen aufgestellten Gleichung seine Formel als berechtigt hinzustellen, so konnten diese beiden Gleichungen ebenso gut der Formel von Medicus als Grundlage dienen. Um seiner Coffeinformel eine sichere Basis zu geben, stellte er zunächst das Einwirkungsprodukt von Brom auf Coffein her, in der Absicht, auf diesem Wege einen allmählichen Abbau desselben zu bewerkstelligen. Durch Behandlung dieses Bromderivates mit alkoholischer Kalilösung erhielt er einen neuen Körper, das





Diäthoxyhydroxycoffein,



dessen Bildung aus Coffein er in folgender Weise veranschaulichte:

1) Ann. 215, p. 292. Vgl. auch Ber. 1882, p. 453.

2) Monatshefte f. Chemie 1881, 1882.



und wies somit das Vorhandensein einer doppelten Kohlenstoffbindung im Coffein nach. Durch successiven Abbau dieser Verbindung gelangte er schliesslich auf zwei neue Körper, das Caffolin und die Caffursäure, welchen beiden Substanzen er auf Grund ihrer Zersetzung durch verseifende Mittel die Formeln ertheilte:




Unter der Voraussetzung, dass die beiden Körpern zukommenden Kohlenstoff-Stickstoffringe identisch sind, hielt er sich für berechtigt, die von ihm angegebene Constitution des Alkaloïds als sicher hinzustellen. Fischer hat jedoch neuerdings die Richtigkeit dieser Annahme mit dem Hinweis auf leicht eintretende Umlagerungen bei den Körpern der Harnstoffgruppe in Frage gestellt.¹⁾ Was aber Strecker seinerzeit nicht vermochte, Theobromin und Coffein als Xanthinabkömmlinge zu erweisen, das gelang Fischer durch Ueberführung des Xanthinbleies in Theobromin mit Hilfe von Jodmethyl.²⁾ Dadurch war die Zusammengehörigkeit des Xanthins, Theobromins und Coffeins bestätigt und zugleich die Struktur des Xanthins durch die Formel des Coffeins festgelegt. Eine endgültige Feststellung der Constitution




1) Ber. 30 (1897), p. 549, 559.

2) Ann. 215, p. 292.


des Coffeins gelang Fischer erst in neuerer Zeit. Die Beobachtung, dass sich die von ihm aus Dimethyluramyl und Kaliumcyanat nach Angaben Tschow's¹⁾ hergestellte γ .Dimethylharnsäure



ohne Schwierigkeit in ein Isomeres des Theobromins, das Theophyllin, umwandeln lasse, wie aus den folgenden Gleichungen ersichtlich ist, hatte sein Vertrauen in die von ihm selbst aufgestellte Formel erschüttert:








Das war noch mehr der Fall, als ihm die Ueberführung von Bromtheobromin in δ .Dimethylharnsäure gelang.



1) Ber. 27, 3082.

2) Fischer u. Ach. Ber. 28, 3135.



Die Entdeckung vollends, dass in alkalischer Lösung sich Hydroxycoffein ebenso leicht in Tetramethylharnsäure überführen lasse, als umgekehrt die Harnsäure durch Jodmethyl in Hydroxycoffein, und insbesondere der Umstand, dass bei Anwendung der Silberverbindung des Hydroxycoffeins sowohl Methoxycoffein als auch Tetramethylharnsäure ¹⁾ entstanden, welche Umsetzungen durch folgende Gleichungen veranschaulicht werden:



nahm ihn völlig für die Formel von Medicus ein.

1) Ber. 30 (1897), p. 549, 559.

Durch die letzteren Gleichungen entsprechenden Umsetzungen war somit die Tautomerie zwischen Hydroxycoffein und Trimethylharnsäure constatirt und ein weiterer Uebergang von der Xanthin in die Harnsäurereihe geschaffen. Durch seine Synthese des Oxycoffeins aus der Trimethylpseudoharnsäure, einem Abkömmling der vor etwa 35 Jahren von A. v. Baeyer aus Uramyl $\text{CO} \begin{array}{c} \text{NHCO} \\ \text{NHCO} \end{array} \text{CH.NH}_2$ und Kaliumcyanat hergestellten Pseudoharnsäure ¹⁾



hat er nunmehr seinem hervorragenden Werke den letzten Stein eingefügt.

1) Ann. 127, p. 1.

2) Ber. 30, p. 549.

Specieller Theil.

Das Coffein ist ein physiologisch stark wirkender Körper, dessen Einfluss auf den Organismus sich in zweierlei Richtung äussert. Einerseits übt es auf gewisse Nervenapparate theils erregende, theils lähmende Wirkung aus — so beeinflusst es das vasomotorische oder Gefässnervensystem derart, dass Contraction der Blutgefässe erfolgt. Wirkungen dieser Art bezeichnet man einfach als Nervenwirkungen. Andererseits zeigt es directe Wirkung auf die Körperzelle, z. B. in der Weise, dass es die Muskulatur des lebenden Thieres zur Erstarrung bringt.¹⁾ Wirkungen dieser Art sind als somatische Wirkungen anzusprechen. Zu dieser letzteren Art rechnet man auch die Erregung der Nierenzellen durch das Alkaloïd zu erhöhter secretorischer Thätigkeit. Dieser secretorischen Wirkung auf die Nierenzelle steht aber der Einfluss auf die Nierenblutgefässe entgegen, welche wie die übrigen Blutgefässe unter dem Einfluss des vasomotorischen Nervencentrums stehen und mithin wie diese eine Volumverminderung erfahren. Nachdem aber die Niere das zur Secretion nöthige Material aus der Blutflüssigkeit entnimmt, dem Organe aber infolge der Contraction der Blutgefässe in einer bestimmten Zeit weniger Blut zugeführt wird, so würde sich eine Verminderung der Diurese geltend machen, wenn der directe Einfluss der Base auf die Nierenzelle nicht vorwiegen würde. Diese Doppelwirkung des Coffeins auf die Niere demonstirte Schröder dadurch, dass er Versuchsthieren einmal Coffein, andererseits, um den Einfluss des Alkaloïds auf das vasomotorische Nervensystem und somit auf die Nierenblutgefässe möglichst einzuschränken, ein Gemisch von Coffein mit Paraldehyd zuführte, welches letzterer ja bekanntlich eine Verminderung der Nerven-thätigkeit im Gefolge hat. War im ersten Falle sowohl diuretische als auch Nervenwirkung bemerkbar, so zeigte sich bei Zufügung von Paraldehyd die diuretische Wirkung verstärkt, die Nervenwirkung auf-

1) Schmiedeberg, Grundriss der Arzneimittellehre III. Aufl. 1895 p. 58.

zuheben. Die Experimente Schröder's machten es wünschenswerth, den Einfluss zu studiren, welchen gewisse an dem Coffeïn-molecul vorgenommene Veränderungen auf den Organismus nach der einen oder andern Richtung auszuüben vermögen. Insbesondere forderte Schröder's Entdeckung dazu auf, nach Coffeinderivaten zu suchen, bei denen die Nervenwirkung des Coffeïns theilweise oder gänzlich fehlte, bei denen aber die somatische Wirkung des Alkaloïds theilweise oder ganz erhalten war und welchen zugleich als einheitlichen Körpern eine constantere Wirkung auf den Organismus zukam, als solche von einem Coffeïn-Paraldehydgemisch vorauszusetzen war. In erster Linie kamen Carbon- und Sulfonsäuren des Coffeïns in Betracht. Gestützt auf die Erfahrung, dass die Carbon- und Sulfonsäuren von Körpern mit starker Nervenwirkung diese Wirkung verloren haben¹⁾ — so besitzen die Pyridinsulfosäure und die Chinolincarbonsäure im Verhältniss zu ihren beiden Grundsubstanzen, dem Pyridin und Chinolin, keine Nervenwirkung mehr — stellten vor einigen Jahren Heinz und Liebrecht²⁾ die Coffeïnsulfosäure her. In der That hat diese Säure auf das vasomotorische Centrum keine Wirkung mehr, ebenso entbehrt sie der übrigen Nervenwirkungen des Coffeïns, besitzt aber kräftige diuretische Wirkung.³⁾ Da jedoch sowohl die Säure, als auch ihre Alkalisalze schwer löslich sind, so sind diese Substanzen zu therapeutischen Zwecken unbrauchbar. Deshalb habe ich auf Veranlassung von Herrn Professor Einhorn unternommen, weitere Coffeinderivate herzustellen, um ihre Wirkung auf den Organismus zu studiren, unter diesen auch die Coffeïncarbonsäure. Homberg⁴⁾ hat diese Säure zwar schon beschrieben, ich habe dieselbe jedoch noch weiter studirt. Ihr leicht lösliches Natronsalz erwies sich zu pharmakologischen Zwecken brauchbar. Wie aus einem weiter unten gebrachten Berichte des Herrn Dr. Heinz hervorgeht, hat der Eintritt der Carboxylgruppe in das Coffeïn jede Nervenwirkung des Alkaloids zum Verschwinden gebracht, während dessen secretorische Wirkung auf die Niere erhalten blieb. Im Verlaufe der Arbeit ist es mir gelungen, aus dem Amide der Coffeïncarbonsäure auch das Aufspaltungsprodukt dieser Säure,

1) Nenki im Archiv für exper. Pathologie und Pharmakologie Bd. XXX, p. 300. Löw im „natürlichen System der Gifte“. München 1893, p. 98.

2) Deutsche med. Wochenschrift 1893, Nr. 45.

3) Jakoby im Archiv für exper. Pathologie und Pharmakologie 130. XXXV, p. 214.

4) Chemikal Journ. 17 p. 402.

die Coffeïdindicarbonsäure herzustellen. Merkwürdigerweise besitzt diese Säure noch stärkere diuretische Wirkung als die Coffeïncarbonsäure, während dieselbe, wie zu erwarten war, ebenso wenig Nervenwirkung zeigt, wie erstere. Bei dieser Gelegenheit ist es mir gelungen, eine neue Darstellungsweise des Coffeïdins aufzufinden, die darin besteht, dass man die Coffeïdindicarbonsäure mit Wasser kocht, wobei sie glatt in Kohlensäure und Coffeïdin zerfällt. Das überraschende bei der Coffeïdindicarbonsäure erhaltene Resultat veranlasste mich, auch das Coffeïdin auf seine physiologische Wirkung prüfen zu lassen. Dabei ergab sich nun, dass die Nervenwirkung des Coffeïns beim Coffeïdin ebenfalls fast vollständig verschwunden war, während die diuretische Wirkung bestehen blieb. Demgemäss lässt sich erwarten, dass die pharmakologisch noch nicht geprüfte Coffeïdincarbonsäure, das Zwischenprodukt zwischen Coffeïdin und der Coffeïdindicarbonsäure, sich gegen den Organismus ähnlich verhalten wird, wie diese. Somit haben wir eine Reihe von Abkömmlingen des Coffeïns zu verzeichnen, die ähnlich wie die Muttersubstanz secretorisch wirksam sind, Coffeïncarbonsäure, Coffeïdindicarbonsäure, wahrscheinlich auch Coffeïdincarbonsäure, endlich Coffeïdin. Was die Darstellung der Coffeïdincarbonsäure betrifft, so wurde dieselbe von Maly und Andreasch¹⁾ durch Verseifen von Coffeïn mit Kalilauge erhalten. Neuerdings versuchte Emil Fischer²⁾, in der Absicht, eine Coffeïnsynthese zu bewerkstelligen, die Coffeïdincarbonsäure aus Coffeïdin aufzubauen, was jedoch nicht gelang. Ich habe versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem ich Chlorkohlensäureester auf Coffeïdin einwirken liess, wobei ich nach dem Vorschlage von Professor Einhorn Pyridin als Salzsäure bindendes Lösungsmittel anwendete; ich erreichte aber das Ziel, Coffeïdincarbonsäureester darzustellen, ebenfalls nicht. Ebenso misslang mir ein Versuch, auf diese Weise unter Benützung von Benzoylchlorid zu Benzoylderivaten des Coffeïdins zu gelangen. Es fehlt zur Zeit wohl noch an Methoden, um Säuregruppen oder andere organische Reste, ausgenommen Alkyle, direkt in das Coffeïdin einzuführen. Von direkt alkylirten Coffeïdinen sind bis jetzt das Methyl-, Dimethyl- und Aethylcoffeïdin von Schmidt³⁾ bekannt geworden, welche durch Einwirkung der entsprechenden Alkyljodide auf Coffeïdin dargestellt werden. Durch Abbau von Anilincoffeïn

1) Monatshefte f. Chemie 4, p. 371.

2) Ber. 30, p. 219.

3) Beilstein 1897, Bd. III.


hat Cramer¹⁾ ein Anilidocoffeïdin erhalten. Eine ganze Reihe von substituirten Coffeïnen gelang es von den Halogencoffeïnen aus darzustellen; so hat z. B. Emil Fischer²⁾ aus Chlorcoffeïn das Aminocoffeïn, Aethoxycoffeïn, Oxycoffeïn, Methoxycoffeïn hergestellt, Magnanini (vgl. Beilstein 1897, III) den Isoamyl- und Phenyläther des Oxycoffeïns; Cramer¹⁾ hat durch Einwirkung von Methylamin, Aethylamin, Hydrazin, Anilin, Toluidin, Xylidin die entsprechenden Coffeïne hergestellt, nämlich das Methylaminocoffeïn, das Aethylaminocoffeïn, Hydrazinocoffeïn, Anilinocoffeïn, das Toluidinocoffeïn, Xylidinocoffeïn, und endlich haben Schmidt und Schilling³⁾ gelegentlich ihrer Studien über Coffeïn aus dem Coffeïnmethyljodid mittelst Silberoxyd das Coffeïnmethylhydroxyd dargestellt. Eine entsprechende Aethylverbindung wurde von Thilden hergestellt. Was die physiologische Wirkung aller dieser Substanzen angeht, so verstärkt das Aethoxycoffeïn den Herzschlag, erhöht den Blutdruck, zeichnet sich aber besonders durch narkotische Wirkung aus, während Coffeïnmethylhydroxyd nach Versuchen von Kobert ungiftig ist. Dagegen steht die Untersuchung der anderen Coffeïnderivate noch aus. Ich habe es mir nun zur Aufgabe gemacht, weitere Substituenten in das Coffeïn einzuführen, und ist es mir gelungen, durch Einwirkung von Diäthylamin, Dipropyl-Diamyl-Dibenzyl-Benzylamin, Piperidin auf Chlorcoffeïn die entsprechenden Coffeïne zu erhalten, nämlich Piperidylcoffeïn (von welchem ich ein Abbauprodukt herstellte), Diäthyl-Dipropyl-Diamyl-Dibenzyl-Benzylaminocoffeïn, welche Verbindungen ich im experimentellen Theile der Arbeit näher beschreiben werde. Ein Versuch, aus Chlorcoffeïn mittelst basisch salicylsauren Kalis ein etwa dem Diuretin entsprechendes Coffeïnderivat zu erhalten, gelang nicht, dabei entsteht Oxycoffeïn. Emil Fischer hat bekanntlich durch Digeriren von Chlorcoffeïn mit alkoholischem Kali bei Wasserbadtemperatur Aethoxycoffeïn erhalten und aus diesem durch Einwirkung von Salzsäure das Oxycoffeïn hergestellt. Durch den Versuch mit basisch salicylsaurem Kali wurde ich veranlasst, alkoholisches Kali auf Chlorcoffeïn bei höherer Temperatur unter Druck einwirken zu lassen und erhielt dabei ein Gemisch von Oxy- und Aethoxycoffeïn; es bildet sich also bei der Einwirkung von alkoholischem Kali auf Chlorcoffeïn unter geeigneten Bedingungen direkt Oxycoffeïn, welches

1) Ber. 27, 3089.


2) Ann. 215, p. 192.

3) Ann. 229.

nach einem auf meine Veranlassung von Herrn Dr. Heinz ausgeführten Versuche ein starkes Gift darstellt. Auf eine Mittheilung der pharmakologischen Eigenschaften der übrigen Substanzen muss ich verzichten, da deren Untersuchung noch nicht zu Ende geführt ist. Die Veröffentlichung wird demnächst an anderer Stelle erfolgen. Auch mit den bereits erwähnten Alkylderivaten des Coffeïdins sind noch keine pharmakologischen Untersuchungen ausgeführt worden. So viel ist aber aus dem bereits vorliegenden Materiale zu entnehmen, dass es von Interesse wäre, synthetisch Verbindungen herzustellen, denen etwa das Schema



zu Grunde liegt, wobei X und Y durch Reste verschiedener Natur zu ersetzen wären, da zu vermuthen ist, dass sich unter ihnen Verbindungen von therapeutischer Wichtigkeit vorfinden werden. —




Coffeïncarbonsäureamid: $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_2 \cdot \text{CONH}_2$. Es war zu erwarten, dass man durch Digeriren von Chlorcoffeïn mit Kaliumcyanid in verdünnter alkoholischer Lösung das Coffeïnnitril erhalten sollte, da ja genannte Methode auch bei den meisten anderen derartigen Reaktionen zur Nitrilbildung führt. Nach Gomberg's Angaben¹⁾ entsteht aber bei diesem Prozesse das Amid der Coffeïncarbonsäure. Von mir beigefügte Stickstoffbestimmungen der Substanz, welche ich auf dieselbe Weise hergestellt hatte wie Gomberg, und welche auch im übrigen mit dem von ihm beschriebenen Amide gleiche Eigenschaften besitzt, beweisen die Richtigkeit seiner Angaben:

Berechnet für	Gefunden:
$\text{C}_9\text{H}_{11}\text{N}_5\text{O}_3$:	29,04 % N
29,54 % N	29,26 % „

Coffeïncarbonsäure: $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_2 \cdot \text{COOH}$. Gomberg führt an, dass eine Verseifung des Amids mittelst eines Gemisches von Schwefelsäure und Wasser bei einer Temperatur von etwa 75 °C. ein Gemisch von Säure, Amid und Coffeïn gibt. Ohne sich weiter mit

1) American Chemikal Journal 17, p. 402.

dieser Methode zu beschäftigen, liess er dieselbe fallen und nahm die Umwandlung des Amids in die Säure durch Einleiten von Stickstofftrioxyd in die Schwefelsäurelösung desselben vor. Der Prozess verläuft folgendermassen:



Ich habe mich mit der von ihm aufgegebenen Methode des Weiteren beschäftigt; so erhielt ich durch 30stündiges Erwärmen von 20 g Amid, welches in ca. 60 cem eines Gemisches von Schwefelsäure und Wasser im Verhältniss 4:3 gelöst war, im Benzolbad und Eingiessen des kalten Reactionsproduktes in 100 g Eiswasser 15 g rohe Säure, welche durch Umkrystallisiren aus Wasser von höchstens 80 °C. gereinigt wurde. In ihren Eigenschaften stimmt die Säure mit dem von G o m b e r g erhaltenen Produkte im Wesentlichen überein. Während aber G o m b e r g für das von ihm erhaltene Produkt den Schmelzpunkt 225—226 ° angibt, habe ich für die von mir erhaltene Säure überhaupt keinen Schmelzpunkt gefunden, hingegen beobachtet, dass sich dieselbe bei ruhigem Erhitzen vollkommen in Kohlensäure und Coffein vom Schmelzpunkt 233—234 ° zerlegt. Eine Analyse der Säure gab:


I. 0,1429 g Substanz bei 80° getr. gaben:	0,1321 g Rückstand (0,0108 g Wasserverl.).
II. 0,13 g " " " " "	0,215 g CO ₂ u. 0,0503 g H ₂ O.
III. 0,2368 g " exsiccator trocken:	0,3672 g CO ₂ u. 0,0993 g H ₂ O.

Berechnet für	Gefunden:
I. C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₄ . 1 aq.:	
7,03 % aq.	7,55 % aq.
II. C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₄ :	
45,38 % C	45,11 % C
4,2 % H	4,3 % H
III. C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₄ . 1 aq.:	
42,19 C	42,25 C
4,68 H	4,65 H

Die lufttrockene Säure bindet 1 Molekül Wasser und ist exsiccatorbeständig. Durch Trocknen bei 80 ° erhält man die wasserfreie Säure. G o m b e r g gibt an, dass sich die Coffeincarbonsäure beim Erhitzen sowohl für sich als auch in wässriger Lösung in Kohlensäure und Coffein zerlege, ohne jedoch seiner Behauptung analytische Daten beizufügen. Ich habe für das in reichlicher Menge entstehende

Erhitzungsprodukt der Säure, nach Umkrystallisiren aus Sodalösung und Wasser, den Schmelzpunkt 233,5 und folgende analytische Daten erhalten: 0,0875 g bei 100° getr. Substanz gaben: 0,1586 g CO₂ u. 0,0411 g H₂O.

Berechnet für



49,48 % C

5,15 % H

Gefunden:

49,33 C

5,22 H

Die Verbindung ist mithin Coffein.

Coffeincarbonsaures Kalium: C₉H₉N₄O₄K. Das Kalisalz, welches ich durch Uebersättigen von Kaliumcarbonatlösung mit der Säure, Ausfällen des entstandenen Salzes mittelst Alkohol aus der sehr concentrirten Lösung und Umkrystallisiren des erhaltenen Niederschlages aus verdünntem Alkohol erhalten hatte, stimmt in Krystallbeschaffenheit und sonstigen Eigenschaften, wie Löslichkeit in Alkohol und Wasser, mit dem Gomberg'schen überein, doch ergab eine Analyse ein etwas abweichendes Resultat:

I. 0,1545 g lufttr. Salz gaben: 0,0403 g K₂SO₄.

II. 0,0952 g lufttr. Salz gaben, bei 75° getrocknet, 0,085 g (0,0102 Verl.) und diese mit Schwefelsäure abgeraucht: 0,0244 g K₂SO₄.

III. 0,1265 g lufttr. Salz gaben, bei 100° getr., 0,1089 g (0,0176 Verl.) und 0,033 g K₂SO₄.

Berechnet für

I. C₉H₉N₄O₄K. 4 aq.:

11,21 % K

II. C₉H₉N₄O₄K. 2 aq.:

12,5 % K

III. C₉H₉N₄O₄K. 1 aq.:

13,26 % K

Gefunden für

lufttr. Salz:

11,68 % K, 11,47 % K

bei 75° getr. Salz:

12,85 % K

bei 100° getr. Salz:

13,49 % K

Das Salz enthält mithin im lufttrockenen Zustande 4 Moleküle Krystallwasser. Dasselbe ist nicht exsiccatorbeständig. Gomberg fand für das bei 140° getrocknete Kalisalz einen Kaligehalt von 12,25 %, entsprechend der Formel C₉H₉N₄O₄K. 2 aq., während das von mir bei 100° getrocknete Salz der Formel C₉H₉N₄O₄K. 1 aq. entspricht. —

Dem Berichte Gomberg's über das Natronsalz habe ich in chemischer Beziehung nichts Neues beizufügen. Herr Dr. Heinz äussert sich über dessen physiologische Wirkung folgendermassen:

Das coffeëncarbonsaure Natrium stellt weisse Krystalle dar, schmeckt bitter und etwas laugenhaft, reagirt alkalisch und löst sich sehr leicht in Wasser, es lässt nichts von den Nervenwirkungen des Coffeëns erkennen und zeigt sich selbst in den 10—20fachen Dosen völlig indifferent. Dagegen regt es die Nieren zu starker Secretionssteigerung an. Intravenöse Injection von 0,25 g coffeëncarbonsaurem Natrium steigerten die Harnsecretion beim Kaninchen bis auf das 45fache (pro Minute). Bei subcutaner Verabreichung war die Harnmenge ebenfalls sehr gesteigert, weniger stark bei innerer Verabreichung, jedoch betrug sie auch hier das 3—4fache der normalen täglichen Harnmenge.

Coffeëncarbonsaures Lithium: $C_9H_9N_4O_4Li$. Auch das Lithiumsalz der Säure ist pharmakologisch von Interesse, weil es mit kräftiger diuretischer Wirkung noch die Fähigkeit verbinden dürfte, mit der Harnsäure lösliche Verbindungen einzugehen. Ich stellte dasselbe in der Weise her, dass ich in wenig Wasser aufgeschlämmtes Lithiumcarbonat mit der Säure übersättigte und die auf diese Weise erhaltene concentrirte Salzlösung mit absolutem Alkohol versetzte. Der entstehende Niederschlag wurde aus verdünntem Alkohol umkrystallisirt und gab so rosettenartig gruppirte glänzende Nadelchen. Die Verbindung ist in Wasser sehr leicht, schwer dagegen in Alkohol löslich.

0,0557 g lufttr. Verb. gaben bei 75° getrocknet: 0,0555 g Salz und diese 0,0122 g Li_2SO_4 .

Berechnet für



2,87 % Li

Gefunden:

2,79 %

Das Salz enthält mithin kein Krystallwasser.

Aus ähnlichen Gründen wurde auch das Piperidinsalz der Säure hergestellt:

Coffeëncarbonsaures Piperidin: $C_9H_{10}N_4O_4 \cdot C_5H_{11}N$. Neutralisirt man eine wässrige Piperidinlösung mit der Carbonsäure, verdunstet zur Trockne und krystallisirt das feste Produkt aus Alkohol um, so erhält man das Salz in Form von kurzen, spitzen Prismen. Dasselbe beginnt bei 110° sich zu zersetzen und schmilzt vollständig bei 233,5°.

0,1023 g Substanz gaben bei 16° C. und 725,5 mm 20 cem N.

Berechnet für



21,67 % N

Gefunden:

21,72 % N

Coffeincarbonsaures Hexamethylentetramin:
 $C_9H_{10}N_4O_4 \cdot (CH_2)_6N_4 \cdot 1 \text{ aq.}$? Versetzt man die Säure mit wässriger Hexamethylentetraminlösung im Ueberschuss und fällt die sehr concentrirte Lösung mit Alkohol, so erhält man eine aus langen feinen Nadeln bestehende Masse, welche nach einmaligem Umkrystallisiren aus Alkohol den Schmelzpunkt 217° besitzt und analysirt folgende Werthe gibt:

0,1112 g Substanz geben: 0,1848 g CO_2 und 0,0533 g H_2O .
 0,0733 g " " 18,2 ccm N bei $11,5^\circ$ und 710,5 mm.

Berechnet für	Gefunden:
$C_9H_{10}N_4O_4 \cdot (CH_2)_6N_4 \cdot 1 \text{ aq.}$:	
45,45 % C	45,32 % C
6,01 % H	5,32 % H
28,28 % N	27,42 % N

Ein Produkt von höherer Reinheit konnte nicht erhalten werden. Ein Versuch, durch gleichzeitiges Lösen der Säure mit einem Ueberschuss von reinem Tetramin in warmem Methylalkohol und Auskrystallisirenlassen ein reineres Produkt zu erhalten, gab nach einiger Zeit in geringer Menge ausfallende, wohl ausgebildete, gelblich gefärbte kleine Prismen vom Schmelzpunkt 217 (Beginn der Zersetzung bei $19^\circ C$).

0,1202 g Substanz gaben 0,191 g CO_2 und 0,0623 g H_2O .

Berechnet für	Gefunden:
$NH \begin{cases} CH_2 \cdot NH_2 \cdot C_9H_{10}N_4O_4 \\ CH_2 \cdot NH_2 \cdot C_9H_{10}N_4O_4 \end{cases}$:	
43,55 % C	43,34 %
5,26 % H	5,75 %

Die Verbindung, welche nur in geringer Menge vorlag und nicht näher untersucht wurde, wäre also als eine Combination von 2 Molekülen Coffeincarbonsäure mit einem Molekül der Base $NH \begin{cases} CH_2 \cdot NH_2 \\ CH_2 \cdot NH_2 \end{cases}$ zu betrachten, welchen Körper Duden und Scharff (vgl. Ann. 288, p. 226) aus dem Einwirkungsprodukt von Benzoylchlorid auf alkalische Hexamethylentetraminlösung neben dem Körper $NH \begin{cases} CH_3 \cdot NH \\ CH_2 \cdot NH \end{cases} CH_2$ in Form der Benzoylverbindungen isoliren konnten.

Coffeincarbonsaures Antipyrin: $C_9H_{10}N_4O_4 \cdot C_{11}H_{12}N_2O$. Diese Verbindung wurde durch Lösen eines Gemisches von 1,4 g fein zerriebener Säure und 1 g Antipyrin in 50 ccm siedendem Aceton

hergestellt. Beim Abkühlen der Lösung erhält man dieselbe in Form von Prismen, welche den Schmelzpunkt 125° besitzen.

0,1078 g Substanz geben: 0,2219 g CO_2 und 0,0503 g H_2O .

Berechnet für
 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O} \cdot \text{C}_9\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_4$:

56,34 % C

5,16 % H

Gefunden:



56,14 % C

5,2 % H


Durch Wasser wird die Verbindung sofort wieder in ihre Componenten zerlegt. Auch beim Umkrystallisiren derselben aus absolutem Alkohol tritt Zersetzung ein. —

Ich versuchte auch, eine der Coffeincarbonsäure entsprechende Theobromincarbonensäure herzustellen, indem ich 5 g Bromtheobromin mit 1 g Kali und 1,3 g Kaliumcyanid in wässrig alkoholischer Lösung unter Rückfluss längere Zeit digerirte. Doch ist es mir so nicht gelungen, ein neues Reactionsprodukt zu erhalten. —

Während Coffeincarbonsäureamid durch Verseifung mittelst Mineralsäuren ohne Aufspaltung des Moleküls in Coffeincarbonsäure übergeht, wird dasselbe durch Einwirkung von Alkali in Coffeïndincarbonensäure verwandelt, ein Vorgang, welcher der Verwandlung von Coffein in Coffeïdincarbonensäure, wie sie von Maly und Andreasch (vgl. Monatshefte 4, p. 231) beschrieben wurde, ganz analog ist.



Normales coffeïdindicarbonsaures Natron:



10 g Coffeïncarbonsäureamid wurden mit 56 g 11procentiger Natronlauge in einem mit Kühlrohre versehenen Erlenmeyerkölbchen ungefähr eine halbe Stunde im Sieden erhalten, bis Lösung eingetreten war und nur noch wenig Ammoniak entwich. Sodann wurde die Lösung behufs Entfernung brauner Flecken, die sich ausgeschieden hatten, durch Asbest filtrirt und in dem erkalteten Filtrat 8 g festes Aetznatron gelöst, wobei allzu starke Temperaturerhöhung möglichst vermieden wurde. Der nach dem Erkalten ausgeschiedene flockige, weisse Niederschlag wurde gut abgesaugt und die Mutterlauge mit weiteren 9 g Aetznatron versetzt, wodurch ein neuer Niederschlag entstand. Die so vereinigten Fällungen, abgesaugt und auf Thon getrocknet, gaben 13 g unreines Salz von gelblich-weisser Farbe. Durch zweimaliges Umkrystallisiren aus wässrigem Alkohol, wobei man die alkalisch reagirende Lösung vorsichtig mit wenig Essigsäure neutralisirt, erhält man das reine Salz in Form von kleinen, wasserhellen, nadelartigen Prismen. Dasselbe ist sehr leicht löslich in Wasser, schwer in Alkohol.

0,3192 g lufttr. Salz geben bei 100° getr. 0,3042 g Substanz (0,015 aq.), bei 120° getr. 0,2837 g Substanz (0,0355 aq.), und nach dem Abrauchen mit Schwefelsäure 0,1265 g Na₂SO₄.


Berechnet für	Gefunden für
C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₅ Na ₂ · 3 aq.:	das lufttr. Salz:
12,99 % Na	12,84 % Na
C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₅ Na ₂ · 2 aq.:	das bei 100° getr. Salz:
13,69 % Na	13,5 % Na
C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₅ Na ₂ · 1 aq.:	das bei 120° getr. Salz:
14,46 % Na	14,45 % Na

Das Salz enthält mithin lufttrocken 3 Moleküle Krystallwasser, nach dem Trocknen bei 100° 2 Moleküle.

Bericht des Herrn Dr. Heinz über das Coffeïdindicarbonsäure-Natrium: Das schwach alkalisch reagirende Salz ist in Wasser leicht löslich. Coffeïdindicarbonsaures Natrium hat

keinerlei Nervenwirkungen; es zeigt in Dosen von 1—2 g keinerlei äussere Wirkungen. Dagegen regt es die Harnsecretion kräftig an. Die Steigerung der Secretion kann bei intravenöser Injection bis zum Dreissigfachen der normalen Harnmenge per Minute betragen.

Coffeïdindicarbonsaures Silber:



Dasselbe fällt aus der Lösung von Silbernitrat beim Zusatz von coffeïdindicarbonsaurem Natrium als weisser amorpher, gelatinöser Niederschlag aus, der nach dem Auswaschen mit Wasser und Trocknen eine gelb gefärbte, amorphe Masse darstellt, löslich in kaltem, leichter löslich in heissem Wasser.

1,2733 g Salz geben bei 50° getr. 0,2694 g Substanz (0,0039 aq.), bei 100° getrocknet 0,2634 g Substanz (0,0099 aq.), und geglüht: 0,1201 g Ag.

Berechnet für
C₉H₁₀N₄O₅Ag₂ · 1 aq.:


44,35 % Ag

C₉H₁₀N₄O₅Ag₂:
45,95 % Ag

Gefunden für
bei 50° getr. Salz:
44,58 %

bei 100° getr. Salz:
45,59 %.

Coffeïdindicarbonsäure:



Wenn man vorsichtig concentrirte Salzsäure zu der kalten concentrirten Lösung des Natronsalzes zufügt, bis keine Fällung mehr eintritt, so erhält man die freie Säure als weissen, leicht durch das Filter gehenden feinkrystallinischen Niederschlag, der mit kaltem Wasser gewaschen und auf Thon getrocknet wird. Eine Analyse der exsiccatorgetrockneten Substanz vom Schmelzpunkt 141° (unter Gasentwicklung) gab folgendes Resultat:

0,0652 g Säure liefern: 0,0932 g CO₂ und 0,0315 g H₂O,
0,2098 g „ „ 39,1 ccm N bei 18,5° C. und 722 mm.

Berechnet für

 $C_9H_{12}N_4O_5 \cdot 1 \text{ aq.}:$

39,4 % C

5,1 % H

20,43 % N


Gefunden:

38,98 % C

5,36 % H

20,33 % N

In Wasser ist die Verbindung unlöslich, zersetzt sich aber bei längerem Kochen damit vollständig in Kohlensäure und einen in der Flüssigkeit gelösten Körper, das Coffeïdin, nach der Gleichung:



Dunstet man die Lösung auf dem Wasserbade ein, so hinterbleibt ein Syrup. Versetzt man denselben mit überschüssigem Aetzkali, so scheidet sich das Coffeïdin als allmählich erstarrendes Oel aus. Dasselbe kann abgehoben und durch Lösen in Chloroform und Verdunsten des Lösungsmittels isolirt werden. So erhält man aus 2 g Säure etwa 1 g Coffeïdin. Der Körper ist in Wasser sehr leicht löslich, ebenso in Alkohol, Chloroform, dagegen schwer löslich in Aether. Mit seinem halben Gewichte concentrirter Schwefelsäure versetzt, liefert er ein Sulfat, welches man durch Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol in Form kurzer, dicker, wasserheller Prismen vom Schmelzpunkt 222° erhalten kann und das in Wasser sehr leicht, in Alkohol unlöslich ist.

0,0771 g Substanz geben: 0,0657 g BaSO_4 .

Berechnet für

 $C_7H_{12}N_4O \cdot \text{H}_2\text{SO}_4:$ 36,83 % H_2SO_4

Gefunden:

35,83 %


Zum Vergleich habe ich auch Coffeïdinsulfat nach der Vorschrift von Maly und Andreasch hergestellt und aus demselben mittelst Aetzkali die Base freigemacht. Dieselbe stimmt sowohl im Schmelzpunkte des Sulfates, als in ihren übrigen Eigenschaften, wie Löslichkeit in Wasser, Alkohol, Schwerlöslichkeit in Aether, mit der von mir erhaltenen Base überein.

Bericht von Dr. Heinz über Coffeïdin: Es war interessant, nachzusehen, wie das Coffeïdin sich zu dem Coffeïn verhalte, insbesondere, inwieweit es dessen Nervenwirkungen, sowie seine

nierenzellenerregende Wirkung zeige. Das Coffeïdin erweist sich fast völlig frei von den Nervenwirkungen des Coffeïns; auf 10fach grössere Dosen zeigen sich keinerlei nervöse Symptome. Im Kymographionsversuch jedoch zeigte sich eine geringe Pulsbeschleunigung, eine Wirkung, die an das Coffeïn erinnert (für Coffeïn ist nämlich neben der Blutdrucksteigerung eine eigenartige Pulsbeschleunigung charakteristisch). Der Blutdruck dagegen wird nicht gesteigert, die Gefässe also nicht verengt. Das Coffeïdin hat anderseits die diuretische Wirkung des Coffeïns beibehalten; es steigert die Harnsecretion bei intravenöser Injection bis auf das 24 fache (pro Minute).

Bereits Emil Fischer hatte vor einiger Zeit den vergeblichen Versuch gemacht, Coffeïdin in den Carbonsäureester zu verwandeln, in der Absicht, aus diesem Coffeïn darzustellen. Ich versuchte ebenfalls, das Coffeïdin mittelst Chlorkohlensäureester in den Carbonsäureester zu verwandeln unter Zuhilfenahme von Pyridin als Lösungsmittel; der Versuch endigte indessen ebenfalls resultatlos.

Wie schon eingangs erwähnt, habe ich zum Zwecke pharmakologischer Forschung versucht, in das Coffeïnmolekül Reste organischer Basen einzuführen. Im Nachfolgenden werde ich die erhaltenen Verbindungen beschreiben:



Erhitzt man 20 g Chlorcoffeïn mit 17 g Piperidin und 75 g Sprit 5 Stunden auf 130—140°, so erhält man nach dem Abdampfen des Alkohols eine in Wasser unlösliche Masse in der Ausbeute von 26,7 g, welche mit Wasser gewaschen den Schmelzpunkt 139° besitzt. Nach zweimaligem Umkrystallisiren derselben aus verdünntem Alkohol erhält man farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 142°; die Verbindung löst sich weder in kaltem noch im heissem Wasser, dagegen in Alkohol und in verdünnter Salzsäure.

0,1158 g Substanz geben: 0,2365 g CO₂ und 0,0731 g H₂O.

Berechnet für
C₈H₉N₄O₂ · C₅H₁₀N:

Gefunden:

56,3 % C

55,7 % C

6,8 % H

7,01 % H

Behufs Herstellung eines Piperidylcoffeins wurden von obiger Verbindung 20 g mit 100 g einer 7 procentigen Lösung von Aetzkali in Alkohol 15 Stunden unter Rückfluss gekocht, bis eine herausgenommene Probe nach dem Abdampfen des Alkohols sich in Wasser klar löste. Hierbei hatten sich ungefähr 5 g Kaliumcarbonat abgeschieden. Das Filtrat von diesem wurde durch Einleiten von Kohlensäure vom unorganischen Materiale befreit, dann abgesaugt und die so erhaltene Flüssigkeit auf dem Wasserbade eingedunstet. Es hinterblieben 14 g dickflüssiges, allmählich erstarrendes Produkt von rothgelber Farbe und alkalischer Reaction, welches zur Beschleunigung der Krystallisation mit wenig absolutem Alkohol versetzt wurde. Nach eintägigem Stehen wurde der gebildete Niederschlag abgesaugt und mit absolutem Alkohol nachgewaschen. Durch Umkrystallisiren des auf dem Filter verbleibenden weissen Rückstandes aus Alkohol erhielt man farblose, wohl ausgebildete Prismen vom Schmelzpunkt 188—189°. Eine Analyse der exsiccatorgetrockneten Verbindung gab:

- I. 0,1591 g Substanz gaben: 0,3128 g CO₂ und 0,1127 g H₂O.
 II. 0,1522 g " " 0,2983 g " " 0,1078 g "
 III. 0,1428 g " " 34,6 ccm N bei 20° C. und 720 mm.
 IV. 0,1479 g " " 35,4 ccm " " 19° C. " 721 mm.

Gefunden:


- I. 53,62 % C 7,88 % H
 II. 53,45 % C 7,85 % H
 III. 26,22 % N
 IV. 26,04 % N.

Ein sicherer Schluss auf die Constitution der vorliegenden Verbindung lässt sich zur Zeit noch nicht ziehen. Den erhaltenen Procentzahlen entsprechend wäre die Substanz vielleicht als das Amid einer Piperidylcoffeidincarbonsäure zu betrachten, welcher Verbindung folgende Procentzahlen entsprechen:

- C 53,06 %
 N 28,5 %
 H 7,48 %

während sich für die freie Säure folgende Werthe berechnen:

- C 52,88 %
 H 7,12 %
 N 23,73 %



5 g Chlorcoffein wurden mit 4 g Diäthylamin und 35 cem Spirit 10 Stunden auf 150° erhitzt. Der Rohrinhalt wurde auf dem Wasserbade eingedampft, der Abdampfrückstand in Salzsäure gelöst und die Lösung mit überschüssiger Soda versetzt. Der so entstandene Niederschlag, abgesaugt und getrocknet, betrug 5,7 g. Durch zweimaliges Umkrystallisiren desselben aus Alkohol und etwas Wasser erhielt man die reine Verbindung in Form von kleinen Prismen. Dieselbe sintert bei $91-92^\circ$ und schmilzt bei 109° . Sie ist in kaltem Wasser ziemlich leicht, in heissem Wasser schwer löslich. In concentrirter Salzsäure ist sie leicht löslich, wird jedoch auf Zusatz von etwas Wasser wieder ausgefällt.

0,144 g Substanz gaben: 0,286 g CO_2 und 0,093 g H_2O .

0,0973 g „ „ 24 cem N bei 21°C . und 721 mm.

Berechnet für

$\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}$:

C 54,34 %

H 7,02 %


N 26,42 %

Gefunden:

C 54,17 %

H 7,16 %

N 26,6 %



5 g Chlorcoffein wurden mit 5 g Dipropylamin und 25 cem Spirit 4 Stunden auf 170° erhitzt und dann in derselben Weise, wie bei Diäthylaminocoffein angegeben, verarbeitet. Die Ausbeute an ungereinigter Substanz betrug 5,8 g. Durch Umkrystallisiren derselben aus Alkohol erhielt man das Dipropylaminocoffein in Form von Prismen vom Schmelzpunkt 95° . Die Verbindung zeigt in Bezug auf Wasser und Säurelöslichkeit ähnliche Verhältnisse wie die Diäthylverbindung.

0,0758 g Substanz gaben 0,1591 g CO_2 und 0,0535 g H_2O .

0,0890 g „ „ 19,7 cem N bei 20°C . und 723 mm.

Berechnet für

$\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}$:

C 57,33 %

H 7,84 %


N 23,88 %

Gefunden:

C 57,25 %

H 7,83 %

N 24,05 %



5 g Chlorcoffein wurden mit 7 g Diamylamin und 20 ccm Sprit 4 Stunden auf 170° erhitzt, dann der Rohrinhalt auf dem Wasserbade eingedampft. Der Rückstand wurde mit Sodalösung verrieben und ausgeäthert. In der Sodalösung blieb der grösste Theil der neuen Base zurück, während die Aetherlösung nach dem Abdampfen ein Gemisch von Diamylamin mit derselben hinterliess, welche beiden Körper durch Destillation mit Wasserdampf getrennt wurden. Der Destillationsrückstand und der noch in der Sodalösung vertheilte Rückstand wurden vereinigt und gaben nach dem Trocknen 6,2 g Rohprodukt. Durch zweimaliges Umkrystallisiren aus Alkohol erhielt man die reine Verbindung in Form von kleinen Nadeln vom Schmelzpunkt 99,5°. Die Verbindung ist in kaltem Wasser sehr schwer, in heissem etwas leichter löslich. Durch concentrirte Salzsäure wird sie gelöst, jedoch beim Verdünnen der Lösung mit Wasser wieder ausgeschieden.

0,1164 g Substanz gaben: 0,2632 g CO₂ und 0,0933 g H₂O.

0,0799 g " " 15,1 ccm N bei 22° C. und 717 mm.

Berechnet für

Gefunden:

C₈H₉N₄O₂ · C₁₀H₂₂N:

C 61,89 %


C 61,68 %

H 8,88 %

H 8,9 %

N 20,06 %

N 20,16 %



5 g Chlorcoffein wurden mit 5 g Benzylamin und 25 ccm 96proc. Alkohol 9 Stunden auf 180° erhitzt, die Mischung zur Trockne verdampft und mit Wasser und wenig Salzsäure verrieben, um überschüssiges Benzylamin in Lösung zu bringen. Der ungelöst bleibende Theil wurde abgesaugt und betrug nach dem Trocknen 65 g. Zur weiteren Reinigung wurde die Masse noch mit Natronlauge behandelt und zweimal aus Alkohol umkrystallisirt. Die so erhaltene, farblose, aus kleinen Nadeln bestehende Verbindung ist in Wasser schwer löslich, leichter in Alkohol. In Salzsäure löst sich dieselbe zwar, wird aber

auf Zusatz von Wasser wieder ausgeschieden, sie verhält sich mithin wie eine sehr schwache Base. Dieselbe sintert bei 226° und schmilzt bei 231° .

0,0945 g Substanz gaben: 0,2078 g CO_2 und 0,0480 g H_2O .
 0,0973 g „ „ 21,1 ccm N bei 20° C. und 724 mm.


Berechnet für
 $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_2 \cdot \text{C}_7\text{H}_8\text{N}$:

C 60,2 %
 H 5,68 %
 N 23,41 %

Gefunden:

C 60,00 %
 H 5,64 %
 N 23,60 %

Dibenzylaminocoffein:



5 g Chlorcoffein wurden mit 8 g Dibenzylamin und 25 ccm Spirit 4 Stunden auf 170 – 180° erhitzt. Der Rohrinhalt wurde zur Trockne verdampft und mit Natronlauge und Aether geschüttelt, um die Chlorhydrate der entstandenen Basen zu zersetzen und zugleich überflüssiges Dibenzylamin zu entfernen. Der in Aether unlösliche Rückstand betrug 5 g. Derselbe konnte erst nach längerem Schütteln mit warmer verdünnter Natronlauge chlorfrei erhalten werden und scheint mithin noch geringe Mengen von Chlorcoffein enthalten zu haben. Nach zweimaligem Umkrystallisiren aus Alkohol erhält man die Verbindung in Form von farblosen, bei 162° schmelzenden Nadeln, unlöslich in Wasser, nicht sehr leicht in Alkohol löslich. Gegen Säure verhält sie sich wie die vorhergehende Verbindung.

0,164 g Substanz gaben: 0,4059 g CO_2 und 0,0870 g H_2O .
 0,0818 g „ „ 13,8 ccm N bei 19° C. und 718 mm.

Berechnet für
 $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_4\text{O}_2 \cdot \text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{N}$:

67,87 % C
 5,91 % H
 18,29 % N

Gefunden:

67,5 % C
 5,8 % H
 18,29 % N

Einwirkung von Chlorcoffein auf o-Amido-dimethylbenzylamin: 5 g Chlorcoffein wurden mit 6,5 g o-Amidodimethylbenzylamin und 25 ccm Spirit 4 Stunden auf 170 bis

180° erhitzt, das Reactionsprodukt wurde zur Trockne verdampft, der Rückstand in Salzsäure gelöst, die filtrirte Lösung mit Kaliumcarbonat übersättigt und der entstandene Niederschlag abgesaugt und mit Wasser, Alkohol und Aether gewaschen. Zieht man die gelbe, trockne Masse mit heissem Alkohol aus, so erhält man beim Abkühlen desselben 4g einer gelben, aus Nadelgruppen bestehenden Masse vom Schmelzpunkt 212—213, welche nicht sehr leicht in Alkohol, dagegen leicht löslich in verdünnter Salzsäure und unlöslich in Wasser ist.

0,0855 g Substanz gaben: 0,1592 g CO und 0,0477 g H₂O.

0,0752 g " " 20,4 ccm N bei 21° C. und 724 mm.

Berechnet für

C₁₀H₁₅N₅O₂:

C 50,63 %

H 6,33 %

N 29,53 %

Gefunden:

C 50,79 %

H 6,19 %

N 29,38 %

Die Verbindung dürfte mithin als Dimethylaminocoffein anzusprechen sein, welches durch Umsetzung von Chlorcoffein mit aus dem o-Amidodimethylbenzylamin entstandenen Dimethylamin hervorgegangen sein dürfte. In ein Reagensgläschen mit alkoholischer Kalilauge eingeschmolzen und 8 Stunden im Wasserbade erhitzt, schied die Substanz Kaliumcarbonat ab und entwickelte Geruch nach Ammoniakbasen. Eine Molekulargewichtsbestimmung gab:

Angewendete Menge des Lösungsmittels (Nitrobenzol: Molecul.

Gefrierpunktserniedrigung 70,7°): 28,693 g.

" Substanzmenge: 0,4801 g.

" Gefrierpunktserniedrigung: 0,59°.

Berechnetes Molekulargewicht für

C₁₀H₁₅N₅O₂:

237

Gefunden:

200

Der Rückstand vom Alkoholauszug, welcher aus einer gelbgefärbten, in Alkohol und anderen Lösungsmitteln, wie Aceton, Aether, Amylacetat, Benzol, unlöslichen, dagegen in Säuren, auch Essigsäure, löslichen Masse im Gewichte von 3g bestand, wurde nicht weiter untersucht.

Ein Versuch, durch Erhitzen von 5g Chlorcoffein mit 8g p-Amidodiäthylbenzylamin und 25ccm Sprit im Rohr auf 170° neue Körper zu erhalten, ergab nur ein in Alkohol unlösliches harziges

Produkt von unerquicklichen Eigenschaften, welches nicht weiter untersucht wurde.

Chlorcoffein und basisch salicylsaures Kali: Behufs Gewinnung einer etwa dem Diuretin entsprechenden Coffeilverbindung wurden 4 g Salicylsäure und 6,6 g Chlorcoffein mit 48 ccm 7proc. alkoholischer Kalilauge 8 Stunden auf ungefähr 230° erhitzt. Beim Oeffnen des Rohres war Druck vorhanden. Der Alkohol wurde abgedampft, der Abdampfückstand in Wasser gelöst und die wässrige Lösung desselben mit Aether behandelt. Der Aether hinterliess nach dem Verdunsten ein gelbes, aromatisch riechendes, syrupartiges Produkt im Gewichte von 1,3 g, das sich in Alkali, nicht in Soda, auch nicht in Säure löste und mit Eisenchlorid Phenolreaktion gab. Die nach dem Ausäthern zurückbleibende, wässrige Flüssigkeit, mit Salzsäure angesäuert, schied eine gelbe, weiche Masse ab, welche nach dem Erstarren abgesaugt und auf Thon getrocknet 6,5 g betrug und sich nach dem Ausziehen mit etwas Aetheralkohol auf 2,6 g reducirte. Durch Eindampfen der salzsauren Lösung und Versetzen der so erhaltenen, vorher noch mit etwas Aether behandelten und dadurch von Salicylsäure befreiten Salzmasse mit wenig Wasser wurde noch 1 g des festen Körpers erhalten, im Ganzen also 3,6 g Substanz. Diese schmilzt nach dem Umkrystallisiren aus wässrigem Alkohol noch nicht bei 290°C. und gab sich durch ihr Verhalten gegen Wasser, Alkohol, Aether, Alkalien, Säuren als Oxycoffein zu erkennen.

0,1014 g Substanz gaben: 0,1705 g CO₂ und 0,0435 g H₂O.

Berechnet für

C₈H₁₀N₄O₃:

C 45,71 %

H 4,76 %

Gefunden:

C 45,85 %

H 4,75 %

Ein Versuch, aus gleichen Theilen Sulfanilsäure und Chlorcoffein beim Digeriren in wässerigalkoholischer Lösung neue Körper zu erhalten, verlief negativ, desgleichen ein Versuch, durch Erhitzen äquimolekularer Mengen Chlorcoffein und Amidobenzoessäure in alkoholischer Lösung neue Produkte zu erhalten. Ebenso blieben Versuche, Coffein mit Amidosalicylsäuremethylester in Reaction zu bringen, sowohl durch Digeriren von 1 g Chlorcoffein mit 1,34 g Amidosalicylsäuremethylester in absolutem Alkohol, als auch durch directes Erhitzen der Componenten für sich oder in alkoholischer Lösung auf 230° im Rohr, erfolglos. Als Hauptprodukt wurde eine braune, harzartige, in Alkali lösliche Masse erhalten.

Emil Fischer (Ann. 215, p. 266) hat durch Digeriren von Chlorcoffein mit alkoholischer Kalilösung auf dem Wasserbade unter Rückfluss Aethoxycoffein dargestellt. Durch das von mir erhaltene Resultat bei der Einwirkung von basisch salicylsaurem Kali auf Chlorcoffein veranlasst, prüfte ich auch das Verhalten von Chlorcoffein gegen alkoholisches Kali bei 220—230°. 6 g Chlorcoffein wurden mit 20 g 7procentiger alkoholischer Kalilauge 4 Stunden auf 220—230° erhitzt. Beim Oeffnen des Rohres zeigte sich jedoch starker Druck und fäkalartiger Geruch. Die Ausbeute an festem Produkt, das sich direct ausgeschieden hatte, betrug 3,7 g. Dasselbe wurde noch mit Alkohol gewaschen und hinterliess beim Lösen in Wasser 1,1 g eines Rückstandes, der sich in der Hauptmasse als Oxycoffein mit etwa 0,2 g Aethoxycoffein erwies. Das alkoholische Filtrat, eingedampft und in Wasser gelöst, dann mit überschüssigem Kaliumcarbonat versetzt, schied noch 1,5 g eines in Chloroform löslichen Oeles ab, das jedoch nicht weiter untersucht worden ist.

Ueber die physiologische Wirkung des Oxycoffeins gibt Dr. Heinz folgendes an:

Das Oxycoffein besitzt vollständig die Nervenwirkungen des Coffeins. Insbesondere zeigt es in ausgesprochenem Masse die für Coffein charakteristische Pulsbeschleunigung und Blutdrucksteigerung (Gefässverengung). Die Harnsecretien zeigte sich anfangs etwas vermehrt, später vermindert. Das Oxycoffein ist im Gegensatze zu den Carbonsäuren des Coffeins und Coffeidins u. s. w. stark toxisch; es wirkt in Dosen von 0,1—0,2 g zunächst stark erregend (Krämpfe machend), dann lähmend, insbesondere Herz, Blutdruck und Athmung lähmend.
